



Gruppo di Bolzano ODV

Ortsgruppe Bozen EO

## **Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Elenco documenti**

**Documento nr. 5 - indagini in banca dati**

- 1. Elenco specie censite in una determinata località di raccolta (San Giacomo di Vizze)**
- 2. Dove è stata raccolta una determinata specie (Cortinarius orellanoides)**
- 3. Collocazione geografica delle zone di raccolta con reticolo (Cortinarius orellanoides)**
- 4. Collocazione geografica delle zone di raccolta senza reticolo (Cortinarius orellanoides)**
- 5. In quali Mesi e in quali Fasce di Altezza è stata raccolta una determinata specie (Cortinarius orellanoides)**

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vize**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Amanitaceae</b>	
Amanita battarrae	
Amanita crocea	
Amanita muscaria	
Amanita ochraceomaculata	sotto conifera (Abete rosso)
Amanita porphyria	
Amanita rubescens	
Amanita spadicea	sotto conifera
Amanita submembranacea	
Amanita vaginata	
Limacella glioderma	
Limacella guttata	sotto conifere
Limacella illinita	sotto conifera
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Agaricaceae - Lepiotoidi</b>	
Chlorophyllum olivieri	sotto conifere (Larice)
Cystoderma amianthinum	
Cystoderma carcharias	tratto aperto del bosco
Cystoderma fallax	sotto conifera
Cystodermella granulosa	
Cystodermella terryi	su legno degradato
Echinoderma asperum	
Lepiota clypeolaria	sotto conifere
Lepiota cristata	
Lepiota fuscovinacea	
Lepiota magnispora	sotto conifera
Squamanita paradoxa	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Hygrophoraceae</b>	
Cuphophyllus colemannianus	pascolo
Cuphophyllus pratensis	su tratti aperti del bosco
Cuphophyllus virgineus	pascolo
Cuphophyllus virgineus var. fuscescens	
Gliophorus psittacinus	gregario sull'erba
Hygrocybe acutoconica	prato
Hygrocybe chlorophana	prato
Hygrocybe coccinea	in luoghi umidi nel pascolo
Hygrocybe conica	in luogo umido
Hygrocybe intermedia	prato
Hygrocybe miniata	pascolo
Hygrocybe mucronella	zona erbosa
Hygrocybe obrussea	
Hygrocybe turunda	nell'erba, su terreno asciutto
Hygrophorus agathosmus	su spiazzi erbosi
Hygrophorus lucorum	sotto Larice
Hygrophorus lucorum var. speciosus	
Hygrophorus pustulatus	sotto conifera

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vize**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - Tricholoma</b>	
Tricholoma aurantium	sotto conifere
Tricholoma inamoenum	sotto conifera
Tricholoma psammopus	sotto conifera (Larice)
Tricholoma saponaceum	
Tricholoma scalpturatum	
Tricholoma sulphurescens	sotto latifolia
Tricholoma sulphureum	
Tricholoma terreum	sotto conifera (Pino)
Tricholoma vaccinum	sotto conifera
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - tricolomoidi</b>	
Calocybe carnea	
Calocybe onychina	
Lepista densifolia	
Lepista nuda	in terreni con humus
Lepista panaeolus	
Lepista piperata	
Lepista subconnexa	nel prato
Lyophyllum decastes var. loricatum	
Lyophyllum flavobrunnescens	sotto latifoglie (Ontano)
Lyophyllum fumosum	
Melanoleuca excissa	tra l'erba
Melanoleuca melaleuca	
Melanoleuca polioleuca	su luogo erboso
Melanoleuca strictipes	pascolo
Melanoleuca subalpina	
Melanoleuca verrucipes	al margine del sentiero
Paralepista flaccida	
Paralepista gilva	sotto conifere
Tricholomopsis rutilans	su legno morto di conifere
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - clitociboidi</b>	
Ampulloclitocybe clavipes	
Armillaria obscura	su tronco di conifera
Catathelasma imperiale	sotto conifera
Clitocybe costata	
Clitocybe fragrans	
Clitocybe globispora	
Clitocybe metachroa	
Clitocybe nebularis	sotto conifera
Clitocybe odora	
Clitocybe rivulosa	prato
Infundibulicybe costata	
Infundibulicybe gibba	
Infundibulicybe splendoides	
Infundibulicybe squamulosa	sotto conifera
Laccaria bicolor	
Laccaria laccata	in zona aperta

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vizze**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
<b>Inizio</b>	
Leucocybe connata	al bordo del sentiero
Leucocybe houghtonii	
Ripartites tricholoma	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - colliioidi marasmoidi</b>	
Collybia cirrata	su funghi marcescenti
Collybia tuberosa	
Flammulina velutipes	su tronco di latifolia
Gymnopus ocior	
Gymnopus perforans	su aghi di conifere
Marasmius oreades	prato
Marasmius wettsteinii	
Mycetinis scorodoni	sotto conifera sugli aghi di pino di Abete rosso
Rhodocollybia butyracea	
Rhodocollybia filamentosa	
Rhodocollybia maculata	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - omfaloidi</b>	
Pseudoclitocybe cyathiformis	
Rickenella fibula	tra erba e muschio
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Tricholomataceae - micenoidi</b>	
Mycena amicta	
Mycena epipterygia	
Mycena polygramma	su ceppaia
Mycena pura	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Pleurotaceae</b>	
Crepidotus cesatii	
Neolentinus lepideus	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Entolomataceae</b>	
Clitopilus cystidiatus	sul prato in prossimità di latifoglie
Entoloma catalaunicum	
Entoloma cetratum	sotto conifera
Entoloma chalybaeum	prato
Entoloma conferendum	pascolo
Entoloma cuneatum	
Entoloma excentricum	prato
Entoloma incanum	nel prato
Entoloma juncinum	bosco umido
Entoloma mougeotii	nell'erba su terreno umido
Entoloma poliopus	torbiera
Entoloma rhodopolium	sotto latifolia
Entoloma serrulatum	al margine del bosco in mezzo all'erba
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Pluteaceae</b>	
Pluteus atromarginatus	su legno morto
Pluteus cervinus	su legno morto di latifolia
Volvariella surrecta	su Clitocibe nebularis

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vizze**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Cortinariaceae - Cortinarius</b>	
Cortinarius balteatocumatilis	sotto latifolia
Cortinarius bovinus	sotto conifera
Cortinarius brunneus	sotto conifera
Cortinarius caesiobrunneus	
Cortinarius callisteus	sotto conifera
Cortinarius camphoratus	
Cortinarius caninus	sotto conifera
Cortinarius caperatus	sotto conifera
Cortinarius claricolor	sotto conifera
Cortinarius colymbadinus	
Cortinarius crassus	sotto Peccio
Cortinarius cyanites	
Cortinarius diasemospermus	sotto latifolia
Cortinarius elegantior	
Cortinarius glaucopus	
Cortinarius hercynicus	sotto conifera
Cortinarius herpeticus	sotto conifera
Cortinarius infucatus	sotto Faggio
Cortinarius laniger	sotto conifera
Cortinarius luteoperonatus	sotto conifera
Cortinarius malicorius	
Cortinarius obscurocyaneus	
Cortinarius odorifer	sotto conifera
Cortinarius renidens	sotto conifera
Cortinarius semisanguineus	sotto conifera
Cortinarius spilomeus	
Cortinarius variicolor	sotto conifera
Cortinarius venetus	sotto conifera

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vize**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - altri Cortinariaceae</b>	
Galerina marginata	su ceppaia di conifera
Galerina triscopa	
Galerina vittiformis	
Hebeloma circinans	sotto Abete rosso
Hebeloma mesophaeum	
Hebeloma syrjense	sotto Peccio
Inocybe appendiculata	sotto conifera
Inocybe fibrosa	
Inocybe flocculosa	
Inocybe fuscidula	
Inocybe geophylla	
Inocybe grammata	
Inocybe gymnocarpa	
Inocybe leiocephala	
Inocybe lilacina	
Inocybe mixtilis	
Inocybe nitidiuscula	
Inocybe piceae	
Inocybe pseudohiulca	
Inocybe rimosa	
Inocybe splendens	
Inocybe striata	
Inocybe terrigena	al bordo del sentiero
Inosperma bongardii	
Mallocybe dulcamara	
Phaeocollybia festiva	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Bolbitiaceae</b>	
Agrocybe praecox	
Conocybe juniana	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae - foliotoidi</b>	
Kuehneromyces mutabilis	
Pholiota lenta	su residui legnosi di Faggio
Pholiota spumosa	su residui legnosi
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Strophariaceae</b>	
Deconica inquilina	su residui vegetali
Hypholoma capnoides	su legno morto di conifera
Hypholoma radicosum	su legno degradato di conifera
Stropharia aeruginosa	
Stropharia cyanea	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Agaricoceae - Agaricus</b>	
Agaricus arvensis	nel prato in prossimi
Agaricus augustus	

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vizze**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Agaricales - Coprinaceae</b>	
Coprinus comatus	su terreno concimato
Panaeolus acuminatus	
Panaeolus caliginosus	prato concimato
Panaeolus papilionaceus	su escrementi
Panaeolus semiovatus	su letame di mucca
<b>Agaricomyceti - Russulales - Lactarius</b>	
Lactarius badiosanguineus	sotto conifere (Picea abies)
Lactarius deterrimus	sotto Peccio
Lactarius mitissimus	sotto conifera
Lactarius picinus	sotto conifera (Peccio)
Lactarius porninensis	sotto Larice
Lactarius pubescens	sotto Betulla
Lactarius scrobiculatus	sotto conifera (Peccio)
Lactarius trivialis	sotto conifera (Peccio)
Lactarius zonarioides	sotto conifera (Picea abies)
<b>Agaricomyceti - Russulales - Russula</b>	
Russula acrifolia	
Russula adusta	sotto Peccio
Russula atrorubens	sotto conifera
Russula chloroides	
Russula decolorans	sotto Peccio
Russula densifolia	
Russula favrei	sotto conifera
Russula firmula	sotto conifera
Russula hydrophila	sotto conifera (Peccio)
Russula integra	
Russula laricina	sotto conifere
Russula mustelina	sotto conifera (Abete rosso)
Russula nauseosa	sotto conifera
Russula ochroleuca	
Russula puellaris	sotto conifera
Russula queletii	sotto conifere
Russula turci	sotto conifera
Russula vesca	
Russula vinosa	sotto conifere
Russula xerampelina	sotto conifere

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vizze**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
Inizio	
<b>Agaricomyceti - Boletales</b>	
Boletus edulis	
Chalciporus piperatus	
Chroogomphus helveticus	sotto conifera
Chroogomphus rutilus	sotto Pino
Gomphidius maculatus	sotto Larice
Imleria badia	
Porphyrellus porphyrosporus	sotto conifere
Suillus bresadolae	sotto conifera (Larice)
Suillus grevillei	sotto Larice
Suillus laricinus	
Suillus viscidus	sotto Larice
<b>Afilloforalemiceti - cantarelloidi</b>	
Cantharellus cibarius	
<b>Afilloforalemiceti - clavarioidi</b>	
Clavulina coralloides	
Ramaria abietina	
Ramaria dolomitica	
Ramaria flaccida	
Ramaria largentii	sotto conifera
Ramaria mairei	
Ramaria testaceoflava	sotto conifera (Abete rosso)
Thelephora caryophyllea	su aghi di conifera
<b>Afilloforalemiceti - poliporoidi</b>	
Albatrellopsis confluens	sotto conifera
Albatrellus ovinus	sotto Peccio
Boletopsis grisea	
Climacocystis borealis	prato
Fomitopsis marginata	su tronco
Gloeophyllum sepiarium	su legno morto
Osteina obducta	sotto Larice
Polyporus varius	su legno morto di latifolia
Postia fragilis	
Postia stiptica	
Trichaptum abietinum	su tronco di conifera
<b>Afilloforalemiceti - idnoidi</b>	
Hydnum repandum	
Sarcodon imbricatus	sotto Peccio



**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - Specie censite a San Giacomo di Vize**

Genere, specie, var, fo	microhabitat - substrato raccolta
<b>Inizio</b>	
<b>Gastromiceti</b>	
Apioperdon pyriforme	su ceppaia
Bovista plumbea	al bordo del sentiero nell'erba
Geastrum fimbriatum	
Geastrum pectinatum	sotto conifere
Geastrum quadrifidum	sotto conifera
Langermannia gigantea	tra l'erba
Lycoperdon excipuliforme	al margine del sentiero
Lycoperdon molle	
Lycoperdon perlatum	
Lycoperdon pratense	zone erbose
Lycoperdon umbrinum	sotto conifera (Peccio)
Lycoperdon utriforme	nel prato
<b>Eterobasidiomiceti</b>	
Calocera viscosa	su ceppaia di conifera
Guepinia helvelloides	in luoghi umidi
<b>Ascomiceti</b>	
Cudonia circinans	sotto conifera
Helvella elastica	lungo il sentiero
Helvella infula	
Helvella lacunosa	su terreno bruciato
Spathularia alpestris	su aghi di conifere
Spathularia flavida	su aghi di conifere
Tarzetta catinus	
<b>Fine</b>	
specie determinate	278

Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - dove è stato trovato il *Cortinarius orellanoides*

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84						
					fascia	da	a	latitudine			longitudine			
								G°	M'	S''	G°	M'	S''	
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3		
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4	4
27.08.2023	Meltina, nei boschi in tutte le direzioni della località Kircheben	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano con Picea, Pinus, Larix, Betulla, Populus, Salix, Fagus, Alnus, ecc.	sotto conifera	4: 1200-1500			46	35	45	11	15	13	
10.09.2023	San Genesio - Jenesien, boschi circostanti il Ristorante Reiterhof Edelweiss	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano e subalpino con abete rosso, pino, larice, faggio ed altre essenze minori	sotto conifera	4: 1200-1500			46	32	41	11	18	52	
6.08.2023	Tisens-Tesimo, nel bosco ai margini della strada, prima e dopo l'abitato di Platzers-Plazzoles	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco misto con abete bianco e rosso, molti faggi e altre latifoglie come betulle e salici; prati umidi; terreno acido a sinistra e basico a destra della strada.	sotto conifera	4: 1200-1500			46	33	8,1	11	7	30,7	
10.07.2022	Altopiano del Renon, boschi adiacenti a Bad Sieß lungo i sentieri nr. 8 e 27	<i>Cortinarius orellanoides</i>	boschi montani di conifere su terreni acidi, con prevalenza di pino silvestre e anche peccio; sui bordi molte latifoglie, come betulle, pioppi, sorbi e ontani	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	34	11	11	27	39	
18.09.2022	Bressanone, San Leonardo, escursioni nei dintorni del parcheggio sterrato situato in prossimità del maso Kaser	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco di conifera con peccio, pino ma anche con sporadica presenza di latifolia come betulla e ontano su terreno prevalentemente acido	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	43	17	11	42	3	
18.07.2021	Nova Ponente, zone boschive adiacenti alla Laabalm, sentieri 1 e 2	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, pascoli e zone paludose	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	23	19	11	26	8	
25.07.2021	Val Pusteria, Pfalzen zona sportiva, bosco di Falzes sentieri 6a, 8 e 17	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco di conifere montane con alcune latifoglie, radure, pascoli e zone umide	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	48	26	11	52	53	
02.08.2020	Altopiano del Renon, boschi adiacenti a Bad Sieß lungo i sentieri 8, 27 e 1A	<i>Cortinarius orellanoides</i>	boschi montani di conifere con molte latifoglie	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	34	11	11	27	39	
06.09.2020	Deutschnofen, Schwarzenbach, boschi nei dintorni dell'albergo "Osteria Rio Nero" sentieri 8 e 9	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano di conifere, presenza di latifoglie lungo i torrenti, zone erbose e pascoli	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	23	28	11	28	4	
09.08.2020	Val Pusteria, Terento, boschi nei dintorni di Oberperting e Nunewieser, sentieri n. 5 e 5b	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, ma anche latifoglie lungo i torrenti	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	50	8	11	48	25	
22.09.2019	Verano, Rohrer, bosco sopra Gasthof Grüner Baum, zona compresa fra i due sentieri n° 16 e 14	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco misto montano con conifere, latifoglie e svariate zone prative	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	36	31	11	14	18	
12.08.2018	San Genesio, Cologna di Sopra, zona boschiva adiacente alla Gasthaus Plattner, sentiero 6A chiamato Martinsweg	<i>Cortinarius orellanoides</i>	grande bosco misto di conifere montane con presenza di molte latifoglie	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	31	21	11	17	54	

Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - dove è stato trovato il *Cortinarius orellanoides*

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
06.08.2017	Nova Ponente, Wölfl-Lupicino, boschi attorno località Miniera-Bergwerk sentiero n° 10	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco di conifere, bosco misto	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	25	15	11	23	37
24.09.2017	Rodeneck, parte ovest del bosco di Rodengo, da località Montano al parcheggio Zumis, Getzenberg	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	47	28	11	43	11
13.08.2017	Dobbiaco, Val di Landro, sentiero 18 da Cima Banche, sentiero 37 o pista da fondo da Carbonin	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco alpino di conifere, su calcare dolomitico	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	37	13	12	10	58
24.07.2016	San Genesio, boschi adiacenti alle località Kampidell-Stegerhof, sentieri nr. 5 e 8	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere miste e con presenza di latifoglie, terreni erbosi e zone di pascolo	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	36	9	11	18	16
14.08.2016	Maranza, località Oberserger - Kiener Alm - Pichlerhütte, sentieri 11 e 12	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	50	19	11	41	20
18.09.2016	Alta val di Funes, Villnöss, St. Magdalena, bosco verso est della Malga Zannes, sentieri 32, 33 e 36	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con poche latifoglie	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	38	6	11	45	56
02.08.2015	Val d'Ultimo, Santa Gertrude, Knödel Moidl, escursione attorno al lago Fontana Bianca	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere aperto e libero anche con cirmoli e ontani verdi	sotto conifera	6: 1800 - 2100			46	29	1	10	49	40
06.09.2015	San Genesio, dintorni di Valas, Leitlhof, monte Rabenbühel, rifugio Lavenna	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano e subalpino di conifere con alcune latifoglie, pascoli e zone paludose	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	35	3	11	18	14
18.10.2015	Nova Ponente, zone boschive adiacenti alla Laabalm, sentieri 1 e 2	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, pascoli e zone paludose	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	23	19	11	26	8
10.08.2014	San Genesio, boschi adiacenti alle località Kampidell-Stegerhof, sentieri nr. 5 e 8	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con pecci, pini, e larici; presenza anche di betulle, pioppi, salici, ontani; molte zone di pascolo	sotto conifera	5: 1500-1800			46	36	9	11	18	16
3.08.2014	Alta Val Pusteria, Rasen-Antholz, nel biotopo Rasun-Anterselva e nei boschi circostanti	<i>Cortinarius orellanoides</i>	torbiera con betulle e ontani, circostante bosco subalpino di conifere con peccio prevalente e larici, diverse zone prative	sotto conifera	3: 900-1200			46	48	21	12	4	24
24.06.2012	Val Passiria, Moos in Passeier, nei boschi circostanti a Breiteben-Pianlargo sentieri nr. 4 e 24	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con alcune latifoglie, zone prative anche umide	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	48	58	11	12	5,4

Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - dove è stato trovato il *Cortinarius orellanoides*

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
2.09.2012	Val Sarentino, Sarentino, Prati, boschi circostanti il Rifugio Sarentino lungo i sentieri nr. 2, 2a, e 10a	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie, diversi pascoli e zone erbose	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	39	6	11	19	20
5.08.2012	Valle di Sesto, dal passo Monte Croce alla Malga Nemes, nel bosco Oberkreuzmoos, sentieri nr. 131 e 13	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con presenza di alcune latifoglie, piccola torbiera, terreno prevalentemente calcareo			1500	2100	46	40	18	12	26	1,3
23.09.2012	Racines, Ridanna, Masseria, Bergwerkmuseum, nelle aree previste dalla Biodiversità 2012	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con presenza di latifoglie lungo i torrenti e le strade, sfagni e zone umide	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	55	44	11	16	16
28.08.2011	Ritten, Pemmern, nei dintorni del parcheggio della funivia Corno del Renon verso le località Grünwald, Saltnerhütte, Lengsteinplatz, sentieri nr. 1 e 7	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco umido subalpino, prevalentemente a Picea, con inclusioni di Larix e Pinus cembra, su terreno prevalentemente siliceo	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	34	32	11	26	48
11.09.2011	Lauregno, dai masi Stabiet e dalla locanda Waldrast sentiero nr. 14	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano, con pecci, larici e latifoglie	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	27	36	11	2	5,4
20.07.2008	Chiusa, Gudon, zona montana che sovrasta Figisterhof e Gnollhof, sentieri nr. 6 e 7	<i>Cortinarius orellanoides</i>	magnifico bosco montano e subalpino di conifere miste (Picea, Pinus e Larix), con inclusioni di betulle, noccioli, pioppi, salici, ontani, ecc	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	38	8,4	11	36	32
10.09.2006	Kastelruth-Castelrotto, parcheggio Bad Ratzes, escursioni lungo la Val di Ratzes, seguendo i sentieri nr. 1, 1a, 3	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano e subalpino con peccio, pino silvestre, larice; molte latifoglie con ontano, pioppo, betulla, salice, nocciolo; molte zone umide a sfagno e anche acquitrini paludosi	sotto conifera	4: 1200-1500			46	31	57	11	35	2,7
25.09.2005	Nals-Nalles, Sirmiano di Sopra-Obersirmian, escursione nei dintorni del ristorante Jager sentiero nr. 8	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco di conifere misto a latifoglie	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	31	43	11	11	15
12.09.2004	Kastelruth-Castelrotto, escursione lungo il sentiero 2a che dalla località Freudeneegg penetra nei boschi del Bannwald, poi del Moosbichl ed infine del Tagusenwald	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano, con prevalenza di pino silvestre, poi peccio, larice; molto pioppo, betulla, salice, nocciolo; molte zone umide a sfagno e anche acquitrini paludosi	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	34	42	11	34	1
14.07.2002	Meltina, escursione nei dintorni della località Kircheben	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano di conifere miste con presenza di latifoglie, terreni erbosi e molte zone a pascolo	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	35	47	11	15	12


Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - dove è stato trovato il *Cortinarius orellanoides*

data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
4.08.2002	Freienfeld-Campo di Trens, Egg-Dosso, escursione nel bosco Nockwald lungo la strada forestale Broatlab	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, prevalentemente Picea; molte zone umide	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	51	2,7	11	29	8,3
4.08.2002	Val Sarentino, Rio Bianco, località Rumsein, nel Biotopo Gisser Au	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di Picea, ma con notevoli presenze, lungo il torrente, di Betula, Alnus, Salix, Sorbus, ecc.	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	45	39	11	22	29
22.09.2002	Alpe di Villandro, Villanders, escursione nel bosco sul lato destro della strada, fra il Samberghof e la Gasserhütte	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, con molte zone umide a sfagno e pascoli	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	38	28	11	29	28
6.10.2002	Tisens-Tesimo, Platzers-Plazzoles, dal parcheggio della Gasthaus Natz in tutte le direzioni lungo i sentieri nr. 4, 4a, 4b, 7, 10, e 11	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, con presenza di faggio e molte zone di pascolo, su terreno calcareo	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	33	29	11	7	14
15.09.2002	Alta Val di Non, Senale - S. Felice, Felixer Weiher/Tretsee, escursioni nei dintorni del Lago di Tret	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, su terreno prevalentemente calcareo, molte zone erbose e di pascolo	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	29	48	11	9	49
22.07.2001	Caldaro in direzione Passo della Mendola, Monte Largaden, boschi adiacenti alla località Masaccio sentieri nr. 9, 7 e 16	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco misto su terreno calcareo con Fagus, Pinus, Picea, anche Larix; ma è presente anche Quercus, Populus, Betula, Alnus	sotto conifera	2: 600 - 900			46	26	25	11	13	57
12.08.2001	Vipiteno, Smudres, bosco circostante Braunhof	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere, prevalentemente Picea, con inclusione di svariate latifoglie;	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	54	34	11	27	28
6.08.2000	Tisens-Tesimo, Bad Grill, escursione da Passo Palade a forcella di Platzoles, lungo i sentieri nr. 10A, 11 e 11A	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco di conifere miste su terreno calcareo, ma anche un bosco di faggi, pascoli, zone umide con sfagni	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	32	32	11	6	57
17.09.2000	Alta Val di Fleres, Fleres di Dentro, escursione dal parcheggio Hinterstein lungo il sentiero che porta alla Ochsenhütte	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco subalpino di conifere con molte zone umide, ruscelli e piccole torbiere	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	58	0	11	19	11
18.07.1999	Val Pusteria, S. Lorenzo di Sebato, boschi nei dintorni della chiesa-santuario Maria Saalen	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco prevalentemente di conifere ma con molte latifoglie, zone umide	sotto conifera	3: 900 - 1200			46	45	55	11	52	2,8
08.08.1999	Nova Ponente - Deutschnofen, Lavazè, escursioni nei dintorni della Malga Campo - Liegalm, lungo la strada forestale	<i>Cortinarius orellanoides</i>	bosco montano di conifere (Picea e Pinus cembra) con sottobosco a mirtillo; la zona è molto umida con forte presenza di sfagno	sotto conifera	5: 1500 - 1800			46	22	16	11	28	34

### Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - dove è stato trovato il Cortinarius orellanoides


data xx.xx.20xx	descrizione percorso escursione	Genere, specie, var, fo	habitat	microhabitat - substrato	altezza			GMS84					
					fascia	da	a	latitudine			longitudine		
								G°	M'	S''	G°	M'	S''
10	35	15	35	15	11	5	5	3	3	3	3	3	
12	60	25	50	20	12	6	6	4	4	4	4	4	4
26.09.1999	Meltina, escursione dalla località Kircheben verso la Malga Sattler	Cortinarius orellanoides	bosco montano di conifere miste con presenza di latifoglie, terreni erbosi e molte zone a pascolo	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	35	47	11	15	12
25.07.1999	Val Casies, Gsies, località Außerpichl e Schindelholz, escursione nel bosco Henzingerwald lungo la strada forestale	Cortinarius orellanoides	bosco subalpino di conifere, prevalentemente Picea	sotto conifera	4: 1200 - 1500			46	46	36	12	9	58

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - collocazione geografica delle zone di raccolta del Cortinarius orellanoides**



anni 2021	2011	2001
2022	2012	2002
2023	2013	2003
	2014	2004
	2015	2005
	2016	2006
	2017	2007
	2018	2008
	2019	2009
	2020	2010
		1999
		2000

**Kartierung - 25 anni di Uscite sul Territorio - collocazione geografica delle zone di raccolta del Cortinarius orellanoides**





**Uscite sul Territorio 25 anni - Cortinarius orellanoides - monitoraggio Mese e Fascia Altezza**

<b>fasce altezza</b>	10: 3000-3300												
	9: 2700-3000												
	8: 2400-2700												
	7: 2100-2400												
	6: 1800-2100	1							1				
	da 1500 a 2100	1							1				
	5: 1500-1800	16						2	6	7	1		
	4: 1200-1500	20						3	8	8	1		
	3: 900-1200	8						1	3	2	2		
	2: 600-900	1						1					
	1: 300-600												
	0: 000-300												
	<b>47</b>						1	9	18	17	2		
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
		anno - mese											